

# ANEXATE®

## FLUMAZENIL

Amp. 1 mg/10 ml.

**FAMILLE** : Antagoniste des benzodiazépines.

### INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

**Aucune.**

**PRÉPARATION ET DILUTION** : NaCl 0,9 %, G5 %, RINGER.

**IVD** : Bolus initial sans dilution 0,3 mg soit 3 ml.

**Administration sur 15 secondes.**

**PSE** : 1 mg dans 20 ml, soit 0,05 mg/ml

<i>Posologie</i>	<i>Vitesse PSE (ml/h)</i>
0,1 mg/h	2
0,2 mg/h	4
0,3 mg/h	6
0,4 mg/h	8

### EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Bouffées vasomotrices, nausées, vomissements, palpitations, anxiété, hypersudation, euphorie, excitation psychomotrice, vertiges, céphalées, crise convulsive, angor, HTA.

### **Levée de l'effet antiépileptogène des benzodiazépines.**

Risque de convulsions chez les patients traités au long cours par antidépresseurs tricycliques.

Risque de ré-endormissement ou de réapparition d'une dépression respiratoire du à l'action de courte durée et à la rapidité de l'élimination du produit.

**Surveillance étroite du patient tout au long du traitement.**